

La **osteoartrosis (OA)**, como su nombre indica, es una enfermedad **de base no inflamatoria**, degenerativa y progresiva de las articulaciones cuyo principal signo clínico es el **dolor crónico**.

A diferencia del perro, en los gatos la osteoartrosis suele ser una **enfermedad de origen PRIMARIO**.

Solensia®
Frunevetmab



Cerca del **90%**
de los gatos mayores de 12 años
muestran evidencias radiográficas
de osteoartrosis.¹



Cerca del **40%**
de los gatos de todas las edades
tienen signos clínicos de osteoartrosis.¹

RECOMENDACIONES SEGÚN LOS EXPERTOS

EDUCACIÓN DE LOS TUTORES



Cuestionario de detección

Conseguimos
una **sensibilidad del ~99%** y
una **especificidad del 100%**
en tutores informados
sobre la OA.¹



Confirmación radiográfica

En todos los casos
se recomienda hacer
un estudio ortopédico
y radiográfico **no solo**
de una articulación,
sino de todas.²



Ensayo terapéutico con Solensia®

Una respuesta positiva
a un ensayo terapéutico
de Solensia® en un gato
puede confirmar
la existencia de OA.²

La **búsqueda proactiva**
de la OA es clave para mejorar
y recuperar su calidad de vida.

Solo el **13%** de los gatos con OA
se diagnostican actualmente

**PORQUE NADIE DEBERÍA SUFRIR EN SILENCIO,
ESTÁ EN TUS MANOS CAMBIAR ESTA SITUACIÓN.**

1. Enomoto et al, Development of a checklist for the detection of degenerative joint disease-associated pain in cats. *Journal of Feline Medicine and Surgery* 2020, Vol. 22(12) 1137-1147. DOI: 10.1177/1098612X20907424.

2. Calvo I., et al., Diagnóstico de la OA felina y comunicación con el propietario. Guía de Manejo de la OA Felina en la nueva era. Zoetis, 2022; (3):22-33

zoetis



Ficha Técnica



En caso de duda,
consulte con
su veterinario

NEOMICINA & POLIMIXINA B

NUEVO
COLIRIO OCULAR
PARA PERROS Y GATOS
QUE COMBINA DOS ANTIBIÓTICOS COMPLEMENTARIOS
PARA UNA COBERTURA DE AMPLIO ESPECTRO CONTRA LAS INFECCIONES OCULARES

DUOMYXIN[®]



4148 ESP



DP | DÔMES
PHARMA

Dômes Pharma Iberia S.L.
Edificio Net-Pharma Ctra. de Fuencarral 22,
28108. Alcobendas, Madrid.
www.domespharma.es
Tel. +34 914 250 065

Galería de imágenes – Oftalmología

Enfermedad corneal felina

E. Fenollosa Romero

Diplomada ECVO, Especialista EBVS en Oftalmología Veterinaria,
Directora de Formación Panacea-Vet

Introducción

La enfermedad corneal felina abarca un grupo de alteraciones que afectan la córnea del gato, incluyendo úlceras herpéticas, secuestro corneal, *hydrops* (edema corneal severo) y queratitis/queratoconjuntivitis eosinofílica. Los signos clínicos comunes son dolor ocular, secreción

ocular, blefaroespasmos y opacidad corneal de diferentes grados. El tratamiento varía según la causa e incluye desde colirios antibióticos o antivirales hasta cirugía en casos determinados. La detección temprana es clave para evitar complicaciones y preservar la visión.



Figura 1. Queratitis eosinofílica. Apariencia irregular de la córnea con placas blanquecinas o rosadas que suelen tener un aspecto granulomatoso (llamadas *cottage cheese deposits* en inglés). Estas lesiones, que pueden sobresalir ligeramente de la superficie corneal, se localizan típicamente en el borde temporal de la córnea, menos comúnmente en el nasal, aunque pueden extenderse si no se tratan adecuadamente. La presencia de vascularización asociada puede variar, pero siempre suele estar presente.



Figura 2. Secuestro corneal. Lesión bien delimitada, de color marrón oscuro a negro, que puede variar de profundidad. Esta área puede estar o no asociada con vascularización corneal de diferente intensidad y puede ir acompañada de blefaroespasmos y secreción ocular desde serosa hasta mucopurulenta. La superficie corneal puede verse irregular y, en casos más avanzados, el secuestro puede ulcerarse o protruir. Esta condición es más frecuente en razas braquicéfalas como el persa o el himalayo, y suele requerir tratamiento quirúrgico, como la queratectomía acompañada o no de injerto corneal.



Figura 3. Secuestro corneal causado por entropion. Zona oscura marronácea, bien delimitada en el centro o zona paracentral. Esta lesión puede acompañarse de edema, vascularización corneal y posible ulceración. El entropion en gatos es a veces causado por enoftalmia, común en gatos geriátricos. Provoca el contacto una irritación constante en la córnea, lo que genera irritación crónica que desencadena el secuestro. Clínicamente, puede observarse blefaroespasmó y secreción marronácea.



Figura 4. Úlcera corneal dendrítica. Presencia de lesiones superficiales, en forma de ramificaciones lineales, patognomónicas de infección por Herpesvirus Felino-1 (FHV-1). Estas úlceras suelen ser superficiales, dolorosas y se tiñen de forma brillante con fluoresceína o rosa de bengala. La córnea puede mostrar edema, opacidad y vascularización periférica. El ojo afectado puede presentar blefaroespasmó, secreción mucosa e hiperemia conjuntival y, en casos recurrentes, puede desembocar en la formación de un secuestro corneal.




Figura 5. Úlcera corneal geográfica. Lesión superficial extensa, irregular y con bordes festoneados, que suele tener una forma geográfica. Esta úlcera es una progresión de las dendríticas, causada por la replicación viral activa en el epitelio corneal. La lesión se tiñe intensamente con fluoresceína y puede acompañarse de edema corneal, hiperemia conjuntival severa, blefaroespasmó y secreción mucosa o mucopurulenta. Es una lesión dolorosa y de evolución variable, típica en gatos con infección por FHV-1.



Figura 6. Queratitis estromal herpética. Córnea con opacidad blanquecina o grisácea difusa en el estroma, generalmente sin ulceración activa. Esta lesión es el resultado de una reacción inmunomediada crónica frente al FHV-1. Está asociada con vascularización corneal superficial o profunda, así como engrosamiento corneal. Clínicamente, el gato puede mostrar blefaroespasmó y secreción ocular moderada, aunque el dolor suele ser menos intenso que en las formas ulcerativas. Esta condición tiende a ser bilateral y recurrente.



Figura 7. Simbléfaron. Córnea parcialmente cubierta por adherencias entre la conjuntiva y la córnea, que suelen ser secuela de infecciones graves por FHV-1, especialmente en gatos cachorros. Estas membranas cicatriciales pueden ser finas o gruesas, y limitar el movimiento del globo ocular y comprometer la distribución de la lágrima. La córnea puede presentar opacidades, vascularización y pigmentación secundaria a la exposición. El simbléfaron puede afectar la visión dependiendo de su extensión y localización.



Figura 8. Hydrops. Córnea marcadamente opaca, edematosa y de aspecto azulado o blanquecino, debido a la entrada masiva de humor acuoso en el estroma posiblemente tras una ruptura de la membrana de Descemet. La superficie puede estar abombada y, en casos severos, la córnea puede presentar deformación severa impidiendo el parpadeo y distribución de lágrima. El ojo afectado suele mostrar dolor, blefaroespasmos, secreción mucosa o mucopurulenta y, en ocasiones, vascularización de la córnea. Es una condición grave que compromete la transparencia corneal y puede amenazar la visión si no se trata adecuadamente.

PHOVIA



REGENERACIÓN CUTÁNEA DE LESIONES Y HERIDAS HASTA EN LA MITAD DE TIEMPO

PHOVIA™ es energía lumínica FLE*, un sistema no invasivo y único. Con la energía de la luz, ayudas a acelerar la reparación de lesiones cutáneas y heridas de tus pacientes de manera rápida y con menos medicación.

Más información en www.phovia.es



- 1: Marchegiani A, Spaterna A, Cerquetella M. Current Applications and Future Perspectives of Fluorescence Light Energy Biomodulation in Veterinary Medicine. Vet Sci. 2021 Jan 25;8(2):20.
- 2: Marchegiani A, Spaterna A, Fruganti A, Cerquetella M. Exploring fluorescent light energy as management option for canine superficial bacterial folliculitis. Front Vet Sci. 2023 Jun 2;10:1155105.
- 3: Marchegiani A, Spaterna A, Cerquetella M, Tambella AM, Fruganti A, Paterson S. Fluorescence biomodulation in the management of canine interdigital pyoderma cases: a prospective, single-blinded, randomized and controlled clinical study. Vet Dermatol. 2019 Oct;30(5):371.

*FLE: fluorescent light energy



www.vetoquinol.es



**“Un pequeño volumen para el gato.
UN GRAN SALTO
para la vacunación felina.”**



Una innovación en
vacunación felina



Más cómoda para
los veterinarios



Más
cat-friendly

Disponible en volumen reducido de

0,5 ml



PUREVAX® Rabies se mantiene con 1 ml

