



LO SUYO ES
EXPLORAR,
LO NUESTRO
PROTEGERLES

NexGard
SPECTRA[®]



Boehringer
Ingelheim

En **Boehringer Ingelheim** creemos que los cachorros **tienen derecho a explorar su mundo libres de riesgo parasitario**, maximizando la socialización y contribuyendo así al desarrollo de perros sanos y felices.



LOS CACHORROS SON ALTAMENTE SUSCEPTIBLES A LAS PARASITOSIS.

CONTROL DE NEMATODOSIS GASTROINTESTINALES:



Ascáridos



Tricúridos



Ancilostómidos

Alto riesgo en cachorros, principalmente *Toxocara canis*.

41% de prevalencia media en cachorros durante los últimos 25 años según estudio europeo¹



Pautas recomendadas por los expertos:

- Desde las 2 semanas de vida hasta las 2 semanas post-destete: **cada 2 semanas**
- Desde las 2 semanas post-destete hasta los 6 meses de edad: **mensual**.*

PREVENCIÓN DE NEMATODOSIS EMERGENTES, ALGUNAS DE ELLAS GRAVES Y OTRAS ZONÓTICAS:



Dirofilaria



Vermes pulmonares



Thelazia

Los cachorros son susceptibles al contacto con vectores desde que nacen. Debido a su carácter exploratorio tienen riesgo de ingerir hospedadores intermediarios.

CONTROL DE ECTOPARÁSITOS:



Pulgas



Garrapatas



Sarcoptes



Demodex

Los cachorros están en riesgo de infestaciones por ectoparásitos, y pueden sufrir en mayor medida las infestaciones intensas por pulgas y garrapatas.



NexGard SPECTRA®

NexGard Spectra® es el antiparasitario oral que ofrece la protección más completa para cachorros**.

Referencias

1. Overgaauw P, Nijse R. Prevalence of patent Toxocara spp. infections in dogs and cats in Europe from 1994 to 2019. Advances in Parasitology, Volume 109. ISSN 0065-308X.
2. ESCCAP. Worm Control in Dogs and Cats. ESCCAP Guideline 01 Sixth Edition - February 2020


*En los cachorros es aconsejable la realización de coprológicos antes de iniciar el protocolo de desparasitación.

** Para cachorros de más de 2kg y 8 semanas de edad.

NexGard SPECTRA®

NEXGARD SPECTRA®, UN ANTIPARASITARIO IDEAL PARA CACHORROS

NexGard Spectra® te facilita dosis mensuales que se ajustan al rápido cambio de peso de los cachorros para alcanzar y mantener la dosis de protección a lo largo de su crecimiento.



NexGard Spectra® se puede administrar desde los 2Kg de peso y las 8 semanas de edad.





¡MUCHAS GRACIAS!

NexGard
SPECTRA



**Boehringer
Ingelheim**

Nexgard® Spectra comprimidos masticables para perros. Composición: Cada comprimido masticable contiene: afoxolaner 9,375 mg/milbemicina oxima 1,875 mg (para perros 2-3,5 Kg); afoxolaner 18,75 mg/milbemicina oxima 3,75 mg (para perros >3,5-7,5 Kg); afoxolaner 37,5 mg/ milbemicina oxima 7,5 mg (para perros >7,5-15 Kg); afoxolaner 75 mg/milbemicina oxima 15 mg (para perros >15-30 Kg); afoxolaner 150 mg/milbemicina oxima 30 mg (para perros >30-60 Kg). Especies de destino: Perros. Indicaciones: Tratamiento de las infestaciones por pulgas y garrapatas en perros cuando esté indicado a la vez la prevención de la dirofilariosis (larva *Dirofilaria immitis*), angiostrongilosis (reducción del nivel de adultos inmaduros (L5) y adultos de *Angiostrongylus vasorum*), thelaziosis (adultos de *Thelazia callipaeda*) y/o el tratamiento de infestaciones por nematodos gastrointestinales. Tratamiento de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis* y *C. canis*) en perros durante 5 semanas. Tratamiento de infestaciones por garrapatas (*Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus*, *Ixodes hexagonus*, *Rhipicephalus sanguineus*) en perros durante 4 semanas. Las pulgas y las garrapatas deben adherirse al hospedador y empezar a alimentarse a fin de quedar expuestas a la sustancia activa. Tratamiento de las infestaciones por nematodos gastrointestinales adultos de las siguientes especies: ascáridos (*Toxocara canis* y *Toxascaris leonina*), anquilostomas (*Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma braziliense* y *Ancylostoma ceylanicum*) y tricúridos (*Trichuris vulpis*). Tratamiento de demodicosis (causada por *Demodex canis*). Tratamiento de sarna sarcóptica (causada por *Sarcoptes scabiei* var. *canis*). Prevención de la dirofilariosis (larvas de *Dirofilaria immitis*) con administración mensual. Prevención de angiostrongilosis (por reducción del nivel de infección con etapas de adulto inmaduro (L5) y adulto de *Angiostrongylus vasorum*) con administración mensual. Prevención del establecimiento de thelaziosis (infección del gusano ocular adulto *Thelazia callipaeda*) con administración mensual. Contraindicaciones: No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente. Uso durante la gestación y la lactancia: No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación y la lactancia o en perros en periodo de reproducción. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio-riesgo efectuada por el veterinario responsable. Reacciones adversas: Reacciones adversas tales como: vómito, diarrea, letargia, anorexia y prurito, se observaron infrecuentemente. Estas reacciones fueron en general de resolución espontánea y de corta duración. Eritema y signos neurológicos (convulsiones, ataxia y temblores musculares) han sido reportados en muy raras ocasiones. Posología: Vía oral. A la dosis de 2,50-5,36 mg/kg de afoxolaner y 0,50-1,07 mg/kg de milbemicina oxima. Los comprimidos son masticables y apetitosos para la mayoría de perros. Si el perro no acepta los comprimidos directamente, pueden administrarse con la comida. La pauta del tratamiento debería basarse en el diagnóstico veterinario y en la situación epidemiológica local. Precauciones: En ausencia de datos disponibles, el tratamiento de cachorros de menos de 8 semanas de edad y de perros que pesen menos de 2 kg debe basarse en la evaluación beneficio-riesgo efectuada por el veterinario responsable. Conservación: Conservar el blíster en la caja con objeto de protegerlo de la luz. N° autorización: EU/2/14/177/002-005-008-011-014-016-017-018-019-020. Presentación: 3 y 15 comprimidos en blísteres. Titular: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.